

Paard koliek voer

wat hebben ze gemeen?



Er zijn verschillende soorten koliek bij paarden, en ze kunnen variëren in ernst en oorzaak. Hier zijn de meest voorkomende soorten koliek:

01 Gascoliek: Dit is de meest voorkomende vorm van koliek en wordt veroorzaakt door een ophoping van gas in de darmen. Het kan ontstaan door veranderingen in dieet of het eten van te veel ruwvoer.

02 Impactiekoliek: Dit gebeurt wanneer de darmen verstopt raken door een ophoping van voedsel of andere materialen. Dit kan vaak worden veroorzaakt door onvoldoende waterinname of een gebrek aan vezels in het dieet.

03 Draaiing of torsie: Dit is een ernstige vorm van koliek waarbij de darmen draaien of zich om zichzelf winden. Dit kan leiden tot een verstopping van de bloedtoevoer en vereist vaak onmiddellijke medische ingreep.

04 Enteritis of colitis: Dit zijn ontstekingen van de darmen die kunnen leiden tot koliek. Ze kunnen worden veroorzaakt door infecties, parasieten of andere gezondheidsproblemen.

05 Spasmodische koliek: Dit type koliek wordt gekenmerkt door krampen in de darmen, wat leidt tot pijn en ongemak. Het kan worden veroorzaakt door stress, veranderingen in dieet of andere factoren.

06 Ziekte van de maag: Hoewel minder gebruikelijk, kunnen maagproblemen ook koliekachtige symptomen veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een maagzweer.



Hoe weet ik of mijn paard koliek heeft?



De symptomen van koliek bij paarden kunnen variëren, maar hier zijn enkele veelvoorkomende tekenen waar je op kunt letten:

01

Onrustig gedrag: Het paard kan onrustig zijn, rondjes lopen of zich moeilijk kunnen ontspannen

02

Rollen: Paarden met koliek kunnen proberen te rollen, wat een manier is om de pijn te verlichten.

03

Zweet: Overmatig zweten, vooral op de buik en schouders, kan een teken van pijn zijn.



04

Niet willen eten: Een paard dat koliek heeft, kan zijn eetlust verliezen en weigeren te eten of te drinken.

05

Kijken naar de buik: Het paard kan vaak naar zijn buik kijken of met zijn achterbenen naar de buik schoppen.

06

Verhoogde hartslag: Een snellere hartslag kan ook een indicatie zijn van pijn of stress.

07

Afwezigheid van mest: Het paard kan minder of geen mest produceren, wat kan wijzen op een probleem in de spijsvertering.

Hoe kan ik koliek voorkomen?



01 Kies het juiste voer: Zorg ervoor dat je paard een uitgebalanceerd dieet krijgt dat past bij zijn leeftijd, gewicht, activiteitsniveau en gezondheid. Dit kan hooi, krachtvoer of speciale supplementen omvatten

02 Hooi: De hoeveelheid hooi die je per paard moet geven, hangt af van verschillende factoren, zoals het gewicht, de activiteit en de gezondheid van het paard. Een algemene richtlijn is om ongeveer 1,5% tot 2% van het lichaamsgewicht van je paard in hooi per dag te voeren.

03 Voer op regelmatige tijden: Probeer je paard op vaste tijden te voeren. Dit helpt bij het creëren van een routine en bevordert een goede spijsvertering.

04 Bied voldoende water aan: Zorg ervoor dat je paard altijd toegang heeft tot schoon en vers water. Dit is net zo belangrijk als het voer zelf.

05 Voer in een rustige omgeving: Zorg ervoor dat je paard in een rustige en veilige omgeving kan eten, zodat hij zich op zijn gemak voelt.

06 Observeer je paard: Let op hoe je paard eet. Als hij niet goed eet of veranderingen in zijn eetgedrag vertoont, kan dit een teken zijn dat er iets mis is.

07 Beweging: Zorg voor voldoende beweging. Regelmatige lichaamsbeweging helpt de spijsvertering en kan koliek helpen voorkomen.

08 Stressminimalisatie:
Probeer stressvolle
situaties te
vermijden, zoals
veranderingen in de
omgeving of het
gezelschap van
andere paarden.
Stress kan bijdragen
aan
spijsverteringsproble
men.



09 Regelmatige ontworming: Zorg voor een goed
ontwormingsschema om parasieten te bestrijden die de
spijsvertering kunnen beïnvloeden.

Een beetje "ugly truth"



Het grootste probleem in deze tijd is hooi. Veel stalhouders kopen goedkoper hooi, voeren te weinig hooi of laten paarden te lang zonder voedsel staan. (Onthoud: 1,5% - 2% per 100 kg lichaamsgewicht. Een standaardpaard van 600 kg zou 9-12 kg hooi per dag moeten consumeren). Daarnaast krijgen ze vaak slechts zeer basaal geconcentreerd voer. Zoals we weten, is elk paard anders. Sommige "good doers" of paarden die alleen in onderhoud zijn (geen training, alleen basisfuncties) zullen het misschien redden, maar elk ander paard zal grote tekorten aan voedingsstoffen hebben. Daarom is het zo belangrijk om je paard op de juiste manier te voeren.

Controleer het bij ons.

Je kunt kiezen voor een basiscontrole, waarbij we de huidige voedselinname van je paard analyseren, of voor een meer professionele aanpak, waarbij we op maat gemaakte voedingsaanbevelingen doen op basis van de behoeften van je paard. Bescherm je paard tegen het risico op koliek en help hem/haar gelukkiger te zijn.

Equine nutrition

www.equi-room.nl

Kortingcode 5%: koliek5

